

Information om **Providence Nightbrace**



Hvorfor skal jeg bruge et natkorset?

Hvis du har fået konstateret fx scoliose, kan det være, at du skal bruge et Providence Nightbrace-korset.

Scoliose er en 3-dimensionel skævhed af ryggen. I nogle tilfælde kræver den behandling med korset som ordineres via ortopædkirurg. Korsettet skal kun anvendes om natten, og indtil din krop er fuldt udviklet.



Forløb

Proceduren fra ordination til udlevering af korsettet forløber i de fleste tilfælde som i det følgende. Alle forløb er dog individuelle. Derfor kan der forekomme variationer.

Ordination

Korsettet er ordineret af en speciallæge på baggrund af kliniske fund og røntgen eller scanning.

Formålet

Målsætningen med Providence korsettet er at undgå forværring af scoliosen.


I nogle tilfælde ses også en opretning af scoliosen. Du skal som udgangspunkt anvende korsettet, til du er færdig udviklet. Det er lægen, der afgør, hvornår du afslutter behandlingen.



Måltagning

Under måltagningen er du iført en stram undertrøje, imens du ligger på et koordinatbræt. Ryggens skævhed korrigeres ved hjælp af nogle klodser. Klodserne placeres i forhold til ryggens skævhed med udgangspunkt i røntgen-billederne.

Ved måltagningen kan der også vælges en farve eller et mønster, som du ønsker, at korsettet skal have.



Udlevering

Ved udleveringen afprøves korsettet, og det sikres, at de oprettende tryk ligger de rette steder. Det kan også være nødvendigt at tilrette kanterne på korsettet.

Brug

Korsettet skal bruges hver nat for at få det optimale resultat – gerne ca. 8 timer. Der vil ofte være noget tilvænning forbundet med for eksempel at skulle finde nye sovestillinger samt følelsen af at have korsettet på. For at undgå unødige trykgener fra for eksempel en undertrøje, der kan krølle, bør du anvende de udleverede undertrøjer, som er sømløse og kan vaskes i vaskemaskine. Det anbefales ikke at anvende bh/top under undertrøjen, da dette øger risikoen for trykgener.



Rengøring

Korsettet rengøres med en fugtig klud eller håndsprit efter behov.

Kontrol

Efter udlevering af dit korset, får du taget et røntgenbillede/CT-scanning i korsettet hos det ordinerede hospital. Resultatet bliver gennemgået af autopæd og bandagist. Du vil blive indkaldt, hvis der er behov for finjustering.

Fornylse

I takt med at du vokser, kan trykket fra korsettet give øget ubehag. Sker det, skal bandagisten kontaktes. Vi tager stilling til, om nuværende korset kan tilrettes, eller om der skal tages mål til nyt.

Den gennemsnitlige anvendelsesperiode på ét korset er ca. 12 måneder.
Du kan booke tid på 7011 0711.